

## **JUSTIFICACIÓN AGRONÓMICA ENSAYO DE QUINOA DE SEGUNDA COSECHA**

### **1. ENTIDAD QUE LO SOLICITA**

COOPERATIVA AGRÍCOLA VIRGEN DE LA OLIVA

### **2. TÉCNICO RESPONSABLE**

JOSE LUIS ANGOY LONGAS

### **3. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR**

ENSAYO DE QUINOA DE SEGUNDA COSECHA

### **4. LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD**

50:95:0:0:15:139:1

### **5. OBJETO DE LA ACTIVIDAD**

Cultivo anterior de cebada. Se intenta buscar una alternativa como cultivo de segunda cosecha. Se realizó el enterrado de la paja, abonado de fondo de 250 kg ha de urea y 250 kg ha de 8-15-15. Se sembró el 14 de julio y la cosecha de la variedad dos se realizó el 1 de noviembre, y la quinoa real, se cosechó el 23 de enero ( por cosecharla lo mas seca posible ya que se produjeron lluvias con anterioridad)

### **6. REPERCUSIONES DE LA ACTIVIDAD**

LA ACTIVIDAD SE HA REALIZADO EN EJECA DE LOS CABALLEROS, HABIENDO ESTADO SEÑALIZADA CORRECTAMENTE CON EL CARTEL HOMOLOGADO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE TIPO DE ACTIVIDADES


### **7. PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD**

Se realiza siembra según corquis

### **8. REFERENCIAS A TOMAR DE LA ACTIVIDAD**

SE VALORARÁ SI EL CULTIVO EN NUESTRAS CONDICIONES PODRIA SER UNA ALTERNATIVA RENTABLE COMO SEGUNDA COSECHA

## 9. RESULTADOS Y CONCLUSIONES



870 kg ha

1400 kg /ha

La variedad dos, maduró mucho más deprisa, por tanto como segunda cosecha se adaptó mucho mejor que la quinoa real, que, hasta que no llegaron las primeras heladas no comenzó a secarse. Aun con todo, la diferencia entre ambas es notable, y, la limpieza de una frente a otra también, puesto que quinoa real, vegetó de forma más abundante y por tanto evitó la proliferación de malas hierbas



