

ATRIADE FRUTICULTORES DE EPILA

Ronda Diputación, 3 – 50290 EPILA (Zaragoza)

Telfs. : 976 60 35 54 / 606 51 19 39 (PILAR) / 651985814 (MAITE)

atriadeepila@gmail.com

24-07-2017 Aviso 13-2017

PAG 1/2

RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTOS

MANZANO

BARRENO Ó CARPOCAPSA:

Seguimos con la segunda generación. En esta semana los vuelos siguen siendo Muy altos. Debido a la virulencia de esta plaga seguir con los tratamientos cada 10-12 días con los siguientes productos:

Tener en cuenta los **PLAZOS DE SEGURIDAD!!!**

PRODUCTO	MAT. ACTIVA	DOSI S (cc ó gr/Hl)	PS	Observaciones
RELDAN	Metil Clorpirifos	400	15	
CALYPSO SC	Tiacloprid	20	14	2 aplicaciones por campaña. 1000 l de caldo por ha.
PROTEUS	Deltametrin+Tiacloprid	60	7	2 aplicaciones por campaña.
IMIDAN LE, FOSDAN 20-E	Fosmet 20%,	375	28	2 aplicaciones por campaña. 1000 l de caldo por ha.
IMIDAN WP, FOSDAN 50 PM ASPID 50 WP	Fosmet 50%	150	28	
KARATE ZEON	Lambda cihalotrin 10%	20	3	1 aplicación por campaña
KARATE KING	Lambda cihalotrin 2.5%	80	7	---
CARPOVIRUSINA	Virus granulosis carpopcapsa	100	NP	
MADEX TOPO TWIM		10	np	

PERAL

BARRENO: Para carpopcapsa, se debe actuar de la misma forma que en el manzano ya que en esta segunda generación la pera tiene un mayor riesgo de daños.

MOTEADO SEPTORIA, STEMPHYLIUM: En Parcelas con DAÑOS, realizar una aplicación después de las lluvias con un fungicida de contacto (CAPTAN,TMTD) alternando con un sistémico para protegerlos e intentar para la infección.

CAIDA PREMATURA DE FRUTOS:

En plantaciones donde se observe una caídas prematura de frutos aplicar de 3 a 10 días antes de recolección uno de los siguientes productos, con T^º entre 15-25º sin rocío y abundante caldo por hectárea.

MAT. ACTIVA	PRODUCTO	DOSIS (Cc ó gr/hl)	PLAZO SEGURIDAD
ANA 1% W.P. ANA 8.5% S.L	Rhodofix,Vifix.. FRUIT FIX K SALT....	200gr 40cc	NO

SILA o MIELETA: En general, la situación está bastante tranquila. Seguir vigilando las parcelas y en caso de tener que realizar tratamientos tener en cuenta los plazos de seguridad de cada producto.

Como en cada parcela se pueden dar casos particulares se recomienda en caso de dudas consultar en la oficina y/o traer una muestra representativa de brotes (25 brotes).

Productos (Boletín Nº 12)

FUEGO BACTERIANO: *Están aumentando los síntomas de infección de esta enfermedad por lo que se deberá prestar especial atención.* Las infecciones detectadas son, mayoritariamente, a partir de corimbos de peras y de manzanas.



Se ruega aumentar la atención.

En el caso de confirmar la presencia de la Bacteria se deberá:

-Reducir del Inóculo: se ha demostrado que el FB. Avanza más rápidamente cuanto más material vegetal infectado hay en la plantación.

-Extirpación y destrucción de las partes afectadas de la planta o arranque de la planta afectada: Cortar y destruir inmediatamente, in situ, por parte sana para frenar el avance de la bacteria.

Desinfectar herramientas con la intención evitar la contaminación a nuevas plantas.(PRODUCTO: **Oxipure**)

PRODUCTOS “AUTORIZACIONES EXCEPCIONALES”:

Desde 17 mayo hasta 14 de septiembre: el Ministerio ha autorizado entre estas fechas las aplicaciones de 2 formulados de cobre; HIDROXIDO CÚPRICO 36%SC, OXIDO CUPROSO 75%wg.

En el Caso de querer utilizarlos consultar en el ATRIA la utilización, por posibles fitotoxicidades en algunas variedades de pera.

ATRIADE FRUTICULTORES DE EPILA

Ronda Diputación, 3 – 50290 EPILA (Zaragoza)

Telfs. : 976 60 35 54 / 606 51 19 39 (PILAR) / 651985814 (MAITE)

atriadeepila@gmail.com

24-07-2017 Aviso 13-2017

PAG 2/2

MELOCOTON Y NECTARINA

MONILIA EN FRUTO: RIESGO ALTO DESPUÉS DE TORMENTAS. Proteger toda plantación que se encuentre. un mes antes de recolección, realizando tratamientos cada 8 días si las condiciones siguen siendo propicias para esta enfermedad.

MAT. ACTIVA	PRODUCTO	DOSIS (Cc ó gr/hl)	PLAZO SEGURIDAD	OBSERVACIONES
CIPROCONAZOL 10%	ATEMI	10-20	14	
IPRODIONA 50% (sc)	ROVRAL ACUAFLO Y VARIOS	100-150	3	MAX2 APLICACIONES CAMPAÑA
IPRODIONA 75% (sc)	ROVRAL	65-100	14	MAX 2 APLIC.CAMPAÑA
TEBUCONAZOL 25% EW	Folicur 25wg	50-75	7dias	MAX 2 O 3 APLICACIONES (DEPENDE DE CADA CASA COMERCIAL)
BOSCALIDA26.7%+PRADOSTROBIN 6.7%WG)	SIGNUM WG	60-75	7 días	
CIPRODINIL 37.5%+FLUDIOXONIL25%	SWITCH	80	7 días	Max 1 aplicación campaña
FLUOPYRAM 50%	LUNA PRIVILEGE	30-50	3días	
FENPIRAZAMINA 50%WG	PROLECTUS	80-120	1 día	Max 3 aplicaciones

TRIPS (*Frankiniella occidentales*): Se siguen viendo daños en variedades sensibles.

Productos:

MAT. ACTIVA	PRODUCTO	DOSIS(Ccógr/hl)	P/S	OBSERV
SPINOSAD	SPINTOR	20-25	7 días	Max 2 tratat/campaña
METIL CLORPIRIFOS	RELDAN	40	15 DÍAS	POCA AFECCIÓN DE PLAGA

GRAFOLITA: Las capturas siguen siendo **ALTAS**, por lo que se deberá realizar un tratamiento, en caso de haber tenido daños en la campaña pasada o ver brotes picados, **PRODUCTOS (DELTAMETRIN, zeta CIPERMETRIN, LAMBDA CIHALOTRIN, FOSMET, TIACLOPRID, BETA CIFLUTRIN).**

MOSQUITO VERDE: Las poblaciones son muy altas, proteger sobre todo en plantaciones jóvenes: materias activas: deltametrin + tiaclorpid; imidacloprid, azadirachtin.

ROYA: Despues de estas tormentas, podemos tener infecciones de Roya.

PRODUCTOS (Mancozeb y ciproconazol).

INFORMACIÓN - MOSCA DE LA FRUTA (*Ceratitis capitata*)

Hasta el momento, capturas siguen siendo bajas pero con el aumento de Tº se prevé un aumento de la plaga, por lo que se realizarán tratamientos desde **tres semanas previas a recolección**.

¡IMPORTANTE! recoger o machacar todos los frutos del suelo después de la recolección para evitar la proliferación de la plaga a otras variedades, **ESPECIALMENTE EN FRUTALES DE HUESO**. **Atención con los diferentes plazos de seguridad y registros para los distintos cultivos:**

Materia activa y formulación	Nombre y casa comercial	Cultivos autorizados	Dosis (cc/hl)	Nº aplicaciones al año	Plazo de seguridad (días)
FOSMET 20% EC	VARIOS (Imidan Le, Supramid20, Fosdan 20)	Melocotonero	375	2	14
FOSMET 50% WP FOSMET 50% WG	VARIOS (Imidan WP, Fosdan 50PM, Aspid, Foslete50)	Melocotonero	150	2	14
METIL CLORPIRIFOS 22,4% [EC]	RELDAN E	Melocotonero	300-400		15
LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS]	AIKIDO,ATRAPA	Manzano, peral	12.5	--	7
	KARATE ZEON	Melocotonero, albaricoquero, ciruelo. Manzano y peral	20	1	3
	POINTER 100CS	Melocotonero	20	1	7
LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% WG	KARATE KING	Frutales de hueso Frutales de pepita	80		7
BETACIFLUTRIN 2,5% [SC]	BULLDOCK-2,5 SC,	Melocotonero, albaricoquero	50-80	3	3
DELTAMETRIN 1,5% [EW]	DECIS PROTECH, AUDACE EC	Manzano, peral,ciruelo	50-80	2	7
		Melocotonero, albaricoquero	50-83	3	3
DELTAMETRIN 2% + TIACLOPRID 15% [OD]	PROTEUS O-TEQ	Manzano, Peral	50-83	3	7
		Melocotonero, albaricoquero, Manzano y peral	50-60	2	7
DELTAMETRIN 2,5% ESP[EC]	SUPERDELTA,	Albaricoquero, ciruelo melocotonero, manzano y peral	50	2	3
	SCATTO/DELTAGRI	Albaricoquero, ciruelo,melocotonero	50	1	7