

EVOLUCIÓN POBLACIONAL

Piojo rojo de California (*Aonidiella aurantii*) : 17 de julio 2015

El piojo rojo de California (*Aonidiella aurantii*) es una de las plagas que más preocupa al sector cítrico en la Comunidad Valenciana ya que deprecia la corteza del fruto y, al tener varias generaciones al año, se reproduce de manera exponencial a lo largo de la campaña.

El momento de aparición de las larvas de la primera generación del año es el óptimo para la realización de un tratamiento fitosanitario y este momento es fácilmente predecible si atendemos a tres factores: la evolución de los estadios del piojo rojo de California en una parcela, el número de machos de piojo rojo de California capturados en esa misma parcela y el promedio de las Integrales Térmicas para esta especie de los municipios más cercanos.

El número de capturas de machos de esta especie nos ayudará a detectar el momento del vuelo que precede a una próxima generación de individuos inmaduros sensibles a plaguicidas y el tiempo transcurrido entre este vuelo y la siguiente generación dependerá de la temperatura, y por tanto, de la evolución de la Integral Térmica.

Se ha dividido la superficie cítrica de la Comunidad Valenciana en 6 agrupaciones (2 en la provincia de Castellón, 3 en la provincia de Valencia y 1 en la provincia de Alicante), y de cada una de ellas se representa la siguiente información:

- 1- La evolución de los porcentajes de los estadios del piojo rojo de California, tomando como muestra una parcela situada dentro de la agrupación.
- 2- Una gráfica que representa el promedio del número de machos de piojo rojo de California capturados en 7 días en la parcela de seguimiento de estadios (no disponible en esta semana).
- 3- La Integral térmica para el piojo rojo de California obtenida como promedio de las obtenidas en las Estaciones Agroclimáticas más cercanas a la parcela de seguimiento de estadios. Como referencia se considera que el máximo de formas sensibles se alcanza con una integral térmica de unos 500°D aproximadamente.

La Integral Térmica indica el número de grados acumulados desde el 1 de enero del año en vigor, que superen la temperatura umbral de desarrollo (para *Aonidiella aurantii* = 11,7 °C); se expresa como grados-día, los cuales se obtienen como la diferencia entre la temperatura media y la temperatura umbral siempre que ésta última se supere y siendo el valor cero cuando la temperatura media sea menor que la umbral. Los datos de temperaturas e integral térmica acumulable de las Estaciones Agroclimáticas son proporcionados por el Servicio de Tecnología del Riego del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).

Resumen de las observaciones hasta la fecha:

En las provincias de Alicante y sur de Valencia hay un predominio de formas sensibles.


En el resto de la Comunidad se observa un predominio de hembras de segunda generación frente a formas sensibles.

El segundo vuelo de machos está finalizando en toda la Comunidad.


Los valores de la integral térmica del 2015 son similares al 2014.

Comarca: La Plana Baixa (Castellón)


EVOLUCIÓN DE ESTADIOS DEL PIOJO ROJO DE CALIFORNIA: Nules



Nº DE CAPTURAS DE MACHOS DE PIOJO ROJO DE CALIFORNIA (en 7 días)






INTEGRALTÉRMICA DE PIOJO ROJO DE CALIFORNIA (valor umbral: 11,7°C)



Red de Vigilancia Fitosanitaria de Cítricos


Comarca: L'Horta Nord (Valencia)




Red de Vigilancia Fitosanitaria de Cítricos

Comarca: La Ribera Alta (Valencia)


EVOLUCIÓN DE ESTADIOS DEL PIOJO ROJO DE CALIFORNIA: Alberic



Nº DE CAPTURAS DE MACHOS DE PIOJO ROJO DE CALIFORNIA (en 7 días)




INTEGRALTÉRMICA DE PIOJO ROJO DE CALIFORNIA (valor umbral: 11,7°C)




Red de Vigilancia Fitosanitaria de Cítricos

Comarca: La Safor (Valencia)


EVOLUCIÓN DE ESTADIOS DEL PIOJO ROJO DE CALIFORNIA: La Font d'En Carròs



Nº DE CAPTURAS DE MACHOS DE PIOJO ROJO DE CALIFORNIA (en 7 días)




INTEGRALTÉRMICA DE PIOJO ROJO DE CALIFORNIA (valor umbral: 11,7°C)




Red de Vigilancia Fitosanitaria de Cítricos

Comarca: El Baix Segura (Alicante)

EVOLUCIÓN DE ESTADIOS DEL PIOJO ROJO DE CALIFORNIA: Formentera del Segura



Nº DE CAPTURAS DE MACHOS DE PIOJO ROJO DE CALIFORNIA (en 7 días)



INTEGRALTÉRMICA DE PIOJO ROJO DE CALIFORNIA (valor umbral: 11,7°C)

